

# Ulotka Pryszczycy i Praktyczny przewodnik bioasekuracji



## CHOROBA

Pryszczycy to choroba bydła, owiec, kóz, świń i innych zwierząt parzystonogich (np. jeleni, saren i dzików), która powoduje powstawanie **pęcherzyków i pęcherzy na błonie śluzowej w jamie gębowej, na wargach, języku, w okolicy otworów nosowych oraz na wymieniu, strzykach, w szparze międzyracicowej i na koronkach racic**. Zakażone zwierzęta niechętnie się poruszają, mają podwyższoną temperaturę ciała, obserwuje się apatię, kulawiznę i utratę apetytu oraz spadek mleczności, a u **bydła obfite ślinienie**. Ciężarne samice mogą ronić, a młode zwierzęta mogą padać bez widocznych objawów klinicznych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Departament Komunikacji i Promocji MRiRW; korekta merytoryczna - Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

Aby zamknąć tryb pełnoekranowy, naciśnij klawisz **Esc**

**PRYSZCZYCA** wspólnie działanie, wspólne bezpieczeństwo

# 1 TRANSMISJA

**Pryszczycza jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób zwierząt parzystokopytnych.**

Kontakt między zwierzętami jest głównym sposobem przenoszenia i rozprzestrzeniania się choroby, ale również pasza, słoma, obornik, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami mogą przenosić wirusa.

Możliwe jest przenoszenie pryszczycy wraz z mlekiem, mięsem i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt, które nie zostały poddane obróbce niszczącej wirusa tej choroby.




# 2 ZAPOBIEGANIE

**Wprowadzanie do gospodarstwa zwierząt o nieznanym stanie zdrowia stanowi bardzo duże zagrożenie dla całego stada.** Większość środków zapobiegawczych jest wspólna dla różnych chorób i jest najlepszym i najtańszym sposobem ochrony stada.

## UNIKAJ:

-  • Zakupu zwierząt niezidentyfikowanych, pochodzących z niewiadomego źródła;
-  • Kontaktów między zwierzętami z różnych stad (np. na pastwisku, kontakt nos w nos przez ogrodzenie);
-  • Odwiedzania innych hodowli zwierząt bez zachowania zasad bioasekuracji;
-  • Wspólnego używania narzędzi, sprzętu i pojazdów wykorzystywanych w innych gospodarstwach.



## STOSUJ:

- Oddzielne miejsca do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;



- Odzież i obuwie ochronne do obsługi zwierząt;



- Niecki, maty lub urządzenia do dezynfekcji obuwia przy wejściu do budynków inwentarskich oraz mycie i dezynfekcję rąk.

# 3 ŚWIADOMOŚĆ

Choroba może powodować bezpośrednie i pośrednie straty ekonomiczne, a stado może być zagrożone. Bardzo ważny jest nadzór nad zdrowiem zwierząt.

**Każde podejrzenie pryszczycy należy niezwłocznie zgłosić służbom weterynaryjnym.**

Powiadomienie jest obowiązkowe i ma zasadnicze znaczenie dla szybkiego zdiagnozowania choroby.